# Surveillance de l'analgésie

## Échelle d'évaluation de la douleur

| 0 | 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 10 |
|---|---|---|---|
| Pas de douleur | Douleur légère | Douleur modérée | Douleur forte à intolérable |

## Échelle d'évaluation de la sédation

**0 :** Alerte

**1 :** Patient occasionnellement somnolent, facile à éveiller

**2 :** Patient fréquemment somnolent, facile à éveiller

**3 :** Patient somnolent, difficile à éveiller

## Médicaments potentialisateurs de sédation (liste non exhaustive)

Atarax® (hydroxyzine), Ativan® (lorazépam), Bénadryl® (diphenhydramine), Dalmane® (flumazepam), Gravol® (dimenhydrinat), Largactil® (clorpromazine), Maxéran® (métoclopramide), Restoril® (témézépam), Rivotril® (clonazépam), Sérax® (oxazépam), Stémétil® (prochlorpérazine), Valium® (diazépam), Versed® (midazolam).

## À risque

- Personne âgée
- Insuffisance rénale ou hépatique
- Maladie pulmonaire
- Troubles neuromusculaires
- Troubles neurologiques
- Consommation récente d'alcool
- Polypharmacie
- Apnée du sommeil
- Enfants < 6 mois

| Date | Heure | Médication | Douleur | Sédation | F.R. | Sat. $O_2$ | T.A. | Pouls | Observation | Initiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |